

Launol®

Loción

Composición y presentación:

Cada 100 mL de loción contiene:

Detalmetrina 0,02 %

Piperonil butóxido 2,50 %

Excipientes: Alcohol Bencílico, Alcohol de Lanolina Acetilado, Esencia de Bergamota sintética, Glicerilo Monoestearato, Metil Glucosa Etoxilada, Polielenglicol Sesquiestearato de Mel Glucosa, Sesquiestearato de Metil Glucosa, Isopropilo Miristato, Propilenglicol, Vaselina Líquida, Agua Purificada.

Indicaciones:

Tratamiento de la Pediculosis humana causada por el pediculus humanus variedad capitis (piojos de la cabeza) y sus huevos.

Clasificación:

Pediculicida. Escabicida.

Contraindicaciones:

Si se presenta irritación primaria o hipersensibilidad en pacientes que usen piretrinas con piperonil butóxido, se debe discontinuar el tratamiento, eliminar la droga lavando la zona implicada y consultar al médico.

Embarazo, lactancia.

Menores de 2 años.

Interacciones:

No existen interacciones en bibliografía consultada.

Reacciones adversas:

Cuando se usan en dosis apropiadas, las combinaciones de piretrinas con piperonil butóxido parecen tener un índice muy bajo de toxicidad.

Pueden ocurrir: Irritación local, incluyendo eritema, prurito, urticaria, edema, eczema y erosión corneal leve.

Debe evitarse el contacto con la cara, ojos, membranas mucosas y beato uretras.

Aunque las piretrinas han sido informadas alérgicas por contacto, la sensibilización ocasional caracterizada por dermatitis, se han debido probablemente a impurezas de las Flores de pyrethrum.

Sin embargo, las preparaciones a base de decametrina, es poco probable que puedan causar sensibilización de la piel.

Precauciones:

Los piretrinas con piperonil butóxido no deben administrarse oralmente o ser inhaladas.

Tampoco deben usarse cerca de los ojos o permitir que entren en contacto con las membranas mucosas.

No debe aplicarse en piel con inflamación aguda o en superficies lesionadas.

Los envases de loción de piretrina con piperonil butóxido deben agitarse antes de usar.

Dosis y modo de empleo:

Laciones que contienen piretrinas con piperonil butóxido se aplican tópicamente.

Para el tratamiento de la pediculosis se debe aplicar abundante loción (Launol Loción), para cubrir la parte pilosa afectada y las áreas adyacentes, teniendo cuidado de evitar el contacto con la cara (ojos, pestañas o membranas mucosas) y beato uretras. Después de 10-15 minutos, se debe lavar el pelo cuidadosamente con champú corriente o agua, secar con una toalla limpia y peinar con

peineta de dientes finos para remover los huevos de piojos. Repetir este tratamiento por 3 días consecutivos y una vez más después de una semana.

Sobredosis:

Si la droga entra en contacto con los ojos, estos deben lavarse completamente con agua.

La ingestión de hasta 50 mg de piretrinas no produce efectos tóxicos. En animales, dosis mayores orales, inhaladas o tópicos de piretrinas ha producido excitación de SNC, incoordinación, temblores, ataques y muerte. Se ha informado de náuseas, vómitos, diarrea, depresión del SNC y enteritis hemorrágica cuando se ingieren cantidades mayores de piperonil butóxido. Para minimizar la absorción de piretrinas y piperonil butóxido luego de su ingestión, debe efectuarse inmediatamente un lavado gástrico y administrar catárticos salinos. El tratamiento por sobredosis incluye principalmente cuidado de apoyo y sintomático.

En caso de aparecer síntomas de sobredosis, trasladar al paciente, junto con este folleto, a establecimiento asistencial para observación o para el tratamiento de los síntomas y control de los signos vitales.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos de alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Almacenar a temperatura ambiente.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.